

**DE NOTEO-
MYELITIDE ET
NOTEO-
MENINGITIDE
QUAEDAM...**

Carlo Tiato



DE

Notae-myeelicide et Notae-meningicide

QUAEQUE

COLLEGIT, ORDINAVIT, EXPOSUIT

CAROLUS TRIPO

PATAVINUS

AD MEDICINAE LAUREAM

ACCEDENS



PATAVII

TYPIS CARTALLIER

MDCCLXXVI



Facsimile



VIRI SPECTATISSIMO
DOMINICO AB TIATO
HOC
LEVE STUDIUM SPECIMEN
HAUD LEVE OBSEQUII AMORIS
ARGUMENTUM
DEVOTISSIMUS NEPOS



DE

NOTO-MYELITIDE, ET NOTO-MENINGITIDE

Morbi denominatio, ac definitio.

Quamvis innumera fere morborum series, quos tum nobilitate proprii textus, tum magnitudine atque extensione functionum in animali oeconomia parit medulla spinalis, attentionem civerit, studiaque foveat medicorum aevi cujusque, nihilominus discordes, atque impares hancdem denominationes fuisse, quae illis tributae sunt. Revera celeberrimus Petrus Frank de hoc vehementer conquirebatur, afferens, e. gr. ad denotandum colicam asturiam, Astruc primum, Sauvages deinde vocem *rachialgiae* adhibuisse, aptiorem contra ad dolores spinas exprimendos; et vocabulum *rachitis* adeo congruum, ut ipse arbitretur, ad visceris hujus inflammationem demonstrandam, de qua sermo tum facturus, ad osium

affectionem a phlogoseos natura longe lateque diversam indigendam, statutum fuisse. Quamobrem haec ipsa inflammatio multifarias habuit denominationes, videlicet: Spinitis, Myelitis, Racho-myelitis, Rachialgia, dum phlogodem pulsam nervosam affici credebatur: Arachnitis, contra, Meningitis rachidica, vertebralis, aut spinalis, dum involucra membranosa ei venarentur. Clarissima littera graecam desinentiam inflammationibus communem suscipiens, rachialgiam in rachialgidem mutavit; haec autem vox, cujus ipse parum sufficientem dignorè proprietatem, organi totius in theca vertebrali contenti inflammationem indigavit, stricto autem vi vocis idem denotaret ac inflammatio doloris spinæ. Professor tandem Ratchetti, Hippocresti adhaerens, qui ubique medullam spinalem nominat, vocabulis utitur prout veteres nempe medulla dorsi, hanc inflammationem vocum graecarum neuu Noto-myelitidem definiendum ratus est, quo concinne argumentum complectebatur. Illum ergo sequentes nos quidem Noto-meningitidem phlogodem, in genere, membransarum viscus ventriculum dicemus.

Multiplices variaeque formas, quas morbus hic potest assumere, propter quas perspicaciarum oculos facile effugit, effecerit ut antehac parum digraveretur, atque ipsius medici quammaxime rarem putarunt. Exactam autem sedis noticiam,

et veritatem characterem quibus hodie insignitur, fructum recentiorum inquisitionum esse, omnemque gloriam saeculo nostro tribuendam, nemo, qui mirabiles progressus, et perfectionis gradum quem temporibus nostris anatomia pathologica, et physiologia adeptae sunt cognoscit, in dubium revocare voluerit. Attamen ubi scripta veterum animadvertantur, etsi nota legum utilitatibus anatomiae pathologicae destituerentur, atque, ob exordientem tunc temporis scientiam, tot physiologiae luminibus carerent, morbum huiusmodi ab his quoque fuisse observatum nemo ibi inficietur. Hippocrates ex primis medullam spinalem praedicavit viscus ad sustentationem actionum animalem, sensus, motusque in trunco et extremitatibus, nec non in thorace et abdomine necessarium; quam sententiam medici ad Galenum usque cohaerunt, et deinceps Trallianus, Paulus Aeginetas amplexi sunt; et praefatus Frank, qui omnium primus in Italia *Noto-myelitis* characteres delineavit, aliquos horum in morbo ab Hippocrate *Pleuritis dorsali* nunciato comprehendit. Alii autem etiam ante Frank, Vogel et Pott malis spinas studuere; deinde celeberrima Palletta quamplicitatem ejusdem inflammationem illustravit. Post impetum quem hi factores dederunt, universi fuerunt medicorum natus in hocce argumentum, atque edita sunt hinc scripta Brera, Bononi, Macaci, Bergamaschi,

Racchetti in Italia; T. Bayton, *Chevalier*, Armstrong in Anglia; Haefner, Schmale, Goehle, Harles, Wenzel, Hinterberger in Germania; Gaultier, Portal, Latour, atque tandem Ollivier et Calmeil in Gallia; qui singillatim huic morbo operam dederunt, atque exactas descriptiones suppeditavere. Horum, ego, illustram virorum liberibus innixus, propriis practica notionibus expert, quaedam collegi, ordinavi, et vobis, perclarissimi Professores, cum exposuimus.

Si morbus organismum pervadens abolitionem vel turbam unius plurimorum organorum secum ducit, in his ipsis alterationibus foras reperitur in quibus, procul dubio, vis et sedes ipsius reperiri poterit. Tali pacto nos de inflammatione medullae spinalis, in thecae vertebralis centro a natura servatae et clausae, sermone habentes, qua ratione ipsius phlogoscos consuetos detegimus characteres, si laesiones sensus excipiuntur, nisi in turbam functionum organii hujus praestantissimi insipientes? Meninges spinales equidem incertas in tali judicandi modo nos relinquere possent, quam palam facta secum non sint officia; atamen sensibilitas, quam ipsae singularem seroso-fibrosarum membrarum adiutor possident, eminenter turbabatur; et insuper quam ubique viscis vertiant, et dicentur ad ipsius mor-

tus, serositas ope quam exulant, facundos, ad ipsum in medio specus suspendendum, et ab externis neis protegendum, clare patet quod ipsarum affectiones infeste in viscera actiones agent, et hinc symptomata, indirecta quamquam, de earum pathologico statu nobis praesto erant.

Revera vidit Magendie spinalis medullae functiones cessare, imminuta vel adacta pressione quam piam meningem in illam exercebat ipse arbitratur, et in cadaverum sectionibus ab hac nervorum lumbarem radice distractas et unitas detexit.

NOTO-NEURALIA.

Symptomata. Virisimus vel, interdum, obtusus dolor a cassis per rachidem sese extendens, scapulae collum vel dorsum afficiens, qui sub corporis motibus exasperatur, et moleste pectoris latere, hypochondria, pelvim et coxas tendit; denique aeger supinus in lecto jacet gravior sit, et praesertim, sicuti Kloss adnotavit, ubi super lectulum calefactum vel plumis confectum, et non supra culcitram velleream decumbat: attamen nunquam sub pressione adangeri visus, dummodo morbus ex laesione externa cutim et vertebrae afficiente non pendent. Huius adnotatur dolori myrmecismi sensus, calor et cruris atque ardor, quem Harles et Gaultier de Clambray cum illo quem ferri lamina candentia, vel cerbo accen-

aus inferre solet, comparaverunt, et qui acutius magis sit, ubi dolor ipse sit major. Nullo tamen secus Harles valde dubium hoc repetat signum; nam saepe una graditur cum plégoni aliorum viscerum et muscularum, speciatim diaphragmatis atque Psoa. Symptomata ista, quo rapidior est phlogoscos decursus, quidam artuum consequitur stupor, qui cito in paralyin transit, cum myrmecismo ingrato; vel eorundem artuum motus impeditur omnino a doloribus, qui sub levisiori affectu augenter ita, ut Ollivier notavit, ut nec toralium pondus feratur. Id tempus est quo excretiones incipiunt inscie demitti, vel ipsarum adest plus minuse completa retentio. Juxta Bostram eveniunt primae sub morbi initio, et contrarium phaenomenon aliquod tempus post ipsius ingressum; quandoque oppositum omni observatum fuit, sicuti et alvum perdurare obstipam totum per morbi decursum, et ad normam urinas excrevit.

Haec phaenomena et caetera, quae anomaliam in functionibus vitae nutritivae dicata ostendunt, uti respiratio, circulatio etc. a phlogosi medullae filamenta lateralia lecenti effici videntur, quia quamvis eadem functiones a systemate ganglionico maxime pro parte stentur, attamen influxus etiam systematis spinalis subficiuntur. Revera, primum nutritionem medullae et vitam praestet, et haec, pro vice, propria filamenta lateralia con-

nervis gangliaribus intesit, unde quaedam ad organa de alterutra vita, instinctu scilicet, et arbitrio participantia, proserpunt. Sic, ad exemplum, necessestius, (Searpa, Willis, et Bellingeri docentibus), ramos qui cum vago decurrunt ad regiones thoracicas et abdominales mittit; sic etiam a nervis sacralibus rami prodeunt sphincteres ani, et vesicae amplectentes; et celeberris Richerand medullae spinæ cor motus principium debere asserit.

Paralysis, de qua superius fuit sermo, haud constantem sequitur semper invadendi modum; namque ipsa modo efficitur ab imo ad summum, et ab inferioribus artubus paulatim ad truncum et ad superiores extenditur, et, respirationem vetans, mortem inducit; modo, quod rarius, a summo fertur ad imum. Similiter latus unum prius aggredi solet, dehinc vero, ab parvam medullae volumen, et alterum; quandoque solummodo, si sensus deest, motus quandoque; vel interdum (plus minores) utrique.

Discrimina haec ab eo pendent, quod nempe phlogosis primo in caso in parte posteriori medullae, et praecise in substantia cinerea, et filamentis radicum posteriorum ab ipsa orientibus et sensui inservientibus, locum teneat; secundo vero in caso in parte anteriori et substantia corticali, unde filamenta motibus voluntariis inservientia derivantur.

Aliquo in casu hae paralytes a spasmatibus clonicis proceduntur; alias artus contracti sunt et dolentes; vel demum relaxati observantur, non rigidi; quae omnia juxta Janson referri debere ad id videntur, quod, vel phlogosis ad membranas sese extendat, vel in pulpa nervosa tantum residet.

Dum autem maxime intensus morbi gradus habetur, in scenam prodeunt tetanus, trismus, aphonia, dyspnoea, et alia; oculi locum adversantur, ipsam aegre ferentes, sonus et surus; nunquam vero observanda evenit videndi audiendique amissa facultas, nisi cerebri ipsius affectione comitante.

Hae generatim cuncta sunt phaenomena, quibus medullae vertebralis phlogosis insituitur; at diversimode modificata adparebunt quam inflammationem partem aliquam tantum visceris tenent, juxta membra diversis respondentia regionibus, quae ab ipsa corripiantur. Symptomata, igitur, et morbi sedes (ipsis velamentis non omnino exceptis) sibi vicissim respondent (quod observatum) tali videbitur pacto:

I.^o Quam phlogosis superius propriam sedem statuit, prout plus minuse protuberantiae anulari proxima sit, medulla ipsa oblongata et encephalon in consensum trahuntur, et hinc saepe sensuum perturbatio, deficitum, trismus; difficile deglutit aeger, qui fremdet, nec verbum proferre

valet; lingua rubra siccaque est, respiratio anxiosa; vomitus adest atque paralyxis generalis. Hydrophobiae symptomata interdum etiam associantur; aegrotus heresi asphycticus moritur.

II.^o Quam phlogosis partem cervicalem tenet, observatur saepius musculorum colli, nec non artuum superiorum rigiditas, qui spasmo quandoque corripuntur vel in paralyxin inducantur; atque tunc istam praecedit quidam torpedinis sensus, qui a digitorum extremitatibus ad manum, et ad totam paulatim sese diffundit brachium. Tali in casu attamen cum sint proximius affectae propagines illae, quae a medulla ad nervum inter-costalem serpunt, a cujus praesentia ganglia cardiaci procedunt, facile deliquium cum gelido sudore exorietur, et habebitur pariter sensus constrictionis ad cor; respiratio valde perturbata nonnisi diaphragmatis opo efficitur.

III.^o Inflammata portione dorsali, in tractu scilicet illo, qui inter geminas inscitur medullae tumescencias, spasmata ad truncum evaduntur, quae et ad artus propagantur tum, cum phlogosi vel alio destructionis processu ipsae corripiantur tumescentibus; respiratio brevis est et cita; cor dissilit et irregulariter pulsat. Pinel (filius) addit saepe nullas nervorum esse functiones; Hippocrates autem, quae specialem huiusmodi characterem considerat deficientia fere aperta erat aegri,

atque urinas sanioas et sanguineas, carnis lotionibus similes, ab illo excerni.

IV.^o Portione denique lumbari, vel potius tubero inferiori medullae inflammato, inferiorum etiam actuum paralytin habebimus; excretionem involuntariam, vel faciem retentionem et urinae; et quendam etiam profundum dolorem lumbos sufficientem, et, juxta Coen, inguines et cavitates articulares pelvis. Praeterea quum praesertim in morbi causa facit ictus, vel lapsus, plus minusve patens observata fuit satyriasis; et dici posset epilepticos etiam accessus in aetnam prodire, quum saepe in individuis hoc morbo correptis, pallaceum quasi inventum facit ejusdem medullae portione mollementum. Generationi Raccetti notat pulvis facile impares esse, parvos, debilesque ita ut ubi signa paralytis ad extremitates non bene clara sint, in errorem trahi quis posset dum asibenicum faceres morbum.

Necroscopia. Medullae substantia emollita, plus minusve propria organisatione destituta, nec non in liquidam quandam flavesceniem, puriformem conversa. Mollitiem notatum fuit occupare, diverso quidem pacto, quodcumque medullae voluminis atque extensionis punctum, et quendam in ipsa crassiliem gignere, intus reliquis vascularibus habentem. Tumescentia lumbaris, inter caeteras medullae partes, sedes fuit saepius praeter phlogosae, sicuti similiter substantia grisea po-

tius quam corticalis. — In casibus qui chronicum ad statum referendi videbantur, textus medullae inventus est colorem et consistentiam praesefferens albuminis oui aquae fervida indurati, quod praesertim ab Esqûel notatum fuit, et ab Ollivier, qui reperit spinalem medullam ita durum, ut vix digito comprimi posset.

NOTO-MENINGITIS.

Symptomata. Meningum spinalium phlogosin rarius ab illa cerebrii sequebantur observamus, ac encephalitidem a phlogosi medullae dorni, ita ut facile discerni possit: eo magis quod nisi postrema temporibus in ipsam auctores intenderint. Ipsa vero suam potest agere cursum absque illa medullae. Nequeunt praeterea singularum meningum phlogosin sejungi, nam una gredi diligunt, quinimo hoc velle supervacaneum esset. Nihil tamen secius cadaverum autopsiae phlogosin effectus potius in arachnoides quam in caeteris sub oculis posuerunt. Symptomata vero, quae sicuti magis simul unita et constantia, quae characteristica habita sunt, haec notata. — 1^o. Contractio generalis musculorum trunci partem posteriorem tenentium, a simplici rigiditate ad maximam contractionis gradum transiens, cum opisthotono; rachis tunc quasi arcus retroflectitur. Interdum quon inflammatio valde cerebri basi

est proxima, portio ipsius cervicalis flexitur quidem retro, sed tunc trunci reliquum propriam directuram atque flexibilitatem naturalem servat.

Meningum rachidicarum phlogosî, continuis aegri agitatio, et situs mutatio quoque tribuebantur, sed modo expositae contractiones libentius quae characteristicae habentur. Revera Dupuytren, Boera, et Bergamaschi arachnoidis spinalis existentiam in tetano comprobaverunt; et F. Hildenbrand, etsi illos reprehendat, qui proximam tetani causam in inflammatione medullae spinalis requirunt, illam tamen velamentorum ejus libenter defendit.

Attamen in hoc casu nervosae etiam pulpaes phlogosî negari non poterit; quae mitis quidem erit, nec febris adeo vehemens.

II°. Dolor plus minasse acerbus per rachidem, eo gravior quo magis intensa sit inflammatio. Dolor iste interdum ailet, et paulo post iterum comparet interjecta, et quavis, juxta alicujus auctoris sententiam, sub pressione exasperetur, hoc tamen dubium remanet. Andral, qui ejusmodi casum observavit pares offerentem characteres, contrariam animadvertit; atque ita pariter Ollivier, qui asteric adaugi contra propter motus ita, ut clamores edere cogatur aeger. Hunc praeter dolorem alias in inferioribus artibus exurgit, et quaedam in his, atque in superioribus, rigiditas. Generatim hic etiam oriri quit trismus, spasmi

clonici, vel paralytic; respiratio difficilis, facies rubra, oculi micantes, speciatim ubi meninges cerebrales eodem morbo corripiantur.

Quod vero hanc a medullae ipsius phlogosi, juxta Ollivier, conjungendum valet, est quod nunquam sensibilitas laesa fuerit in artibus abdominalibus; facultas haec integra usque ad morbi finem perduravit, dum e contra in *noto-myelitis* constanter adparuit perturbata (1).

Necropsia. Ubi morbus traumaticum dignoscatur originem, non raro evenit quod lacerationes etiam ad vertebrae extendantur. Dissecti theci *aracnoides*, invenitur plerumque arachnoideae colore violaceo pictae, et huc illuc densatae; ipsam vulnerato, et statim exire de vulnere serum quandoque sanguineum videbis. Obrutam saepe congestam erit ipsam cernere strata membranacea opaca, albida, plus minusve adhaerenti, consistentiae variantis, qui simul unire quid radices nervorum lumbares. Serum illud sanguinolentum inter arachnoideam et meningem primam invenitur, atque plam inter et medullam materies inventa floccosa, spissa, albo-flavescenti vel viridescens. Hoc etiam in casu, si inflammatio chronica fuerit, arachnois alba reperitur, stipata et fere ossea-facta. Cartilaginea frustula, et calcareae concretiones Morgagniae invenit.

(1) Haec tam *noto-myelitis* quam *noto-meningitis* spectant.

Fabrâ, quae necessario letâ inflammationibus associatur, dato non semper tempore, accedit. Interdum enim praecedit, modo vero morbum consequitur, praesertim ubi a causâ traumaticâ procedat. Aggredi plerumque solet frigore intenso, cui urens calor succedit; ipsius typus potius continuus est quam remittens, vel saltem parum notabiles remissiones observantur. Pulsa maxime irregulares habentur; cæcis nunc valde sicca, brevi multo madefit sudore; tubus digerens nullam in affectione habere partem videtur, nisi quod ipsius functiones, ob alimentorum stimulos deficientes, silent. Attamen sit non raro quod ipse plus minuse irritatus adpareat. Accessio febrilis, generatim, non semper pari passu cum morbi gravitate greditur; saepe etenim imminui videtur, quando aeger jam jam est moriturus.

Status chronicus. Neminem latet, hoc namque probatum, utrasque hæc phlogoses ad statum chronicum transire posse. Attamen inflammatio meningum talem sequutam fuisse deinceps rarius vias, vel saltem fere inæstimata ejus fuerit symptomata. Phlogosis vero medullæ, clavis, nascitur Rostan, per dolorem obtinuit ad rachidem manifestam fieri, qui saepe nec sentitur ab aegro, nec a medico agnoscitur nisi tum, cum digitorum extremitates super rachidæ apophyses successive ferat, easque leviter comprimat; praeterea comitatur saepe a statu pariter doloroso artuum sub

pressionem. Ardor raro notatus, vel vix de ipso aegri conquisiti. Tempore eunte artuum paralyia gradatim eveniūt cum caloris immixtione, et ardoris in ipsis cessatione, cui unitur in progressu vesicae atque recti intestini functionum perturbatio.

Morbi similes. — Quam supradictas phlogoses decursum valde rapidum saepe sequuntur, easque exitus funestissimi comitentur, cum istis interdum confundi posse diffidicatum est. Attamen innumerae aliae affectiones illas facile simulare queunt; ideoque permaxime intendendum symptomatibus propriis atque constantibus a nobis super expositis. Has inter postremas: I. *Encephalitis* recommenda; at in ista nunquam musculares motus laeduntur, verum facultates intellectuales, atque sentientes. — II. *Pharyngitis* et *Oesophagitis*; at in prima phaenomena topica habentur, et deglutitio difficilis tantum fit ad faucium isthmum, in altera vero multo inferius impeditur; in utroque autem motus integri remanent. — III. *Pleuritis dorsalis*; at istius differentia notata; tactu etenim dolor quam maxime exasperatur, nec stetoscopia vel percussio ullam, per totam morbi decursum, organicam alterationem adesse monebunt. — IV. *Rheumatismus acutus rachidis*, qui distinguitur propter dolorem, qui tantum extimam muscularem dorsae partem tenet, et gravior fit sub tactu, et frigoris actione. Prae-

teret tumor exime, rubor, atque calor habentur. — V. *Diaphragmatis postica*, quae ab illa eo differt quod diaphragmatis directionem dolor sequatur, et sub inspiratione exacerbatur et tussu, et sterminatione etc. Praeterea respiratio omnino est sublimis, et singultus continuus. — VI. *Phlegones eodem etiam cum Mesentericis cum, Proctis, cum Nephritis, confundi possent etc.* et exacta symptomatum notio, quae istarum characteristicae sunt, et summa attentio ad illa motoris apparatus habita, valebunt utique ne quis in errorem incidat.

Clarissimus pariter monet Harles, ut accuratum institatur examen horum symptomatum in infantibus, cum experientia fuerit evictus quod multi morbi, qui brevi ipsi funesti redeunt, semel habiti quae tunc intestinali respicientes, vel quae difficilis dentitionis effectus, vel helminthiasis, comitante, vel saepius lenta paralyti extremitatum consequente, nil aliud sint nisi choroicae spinalis medullae inflammationes. Hoc idem asserere non dubitavit celeb. Goulis, experientia et necropsia edoctus, qui accurate etiam illas descripsit.

Morbi divisio. Inflammatio medullae spinalis, ejusque velamentorum in acutam sive athenico-arteriosam a Breus et Harles distincta fuit; in subacutam et chronicam plus minusve venosam ab eisdem, qui nos de quadam lymphatica do-

rest. Aliæ autem admittuntur differentiae, myeloidis scilicet idiopathicae et violentiae nempe topicae interque aliæ et disturna valdeque compressione; et suppressis secretionibus hac metastatice appellatis; et vasorum absorptionum, vel glandularum viciis circumambientium excitamento; sympathice ex consensuali irritatione, ex aliarum, ut jam jam videre est, affectionum transgressa.

Quaedam praeterea *epidemica* designabatur, quae Alligoni (Albenga) Liguriae a medico Hyacintho Rossi, iuente vere an. 1814, adulto autem vere an. 1817 Anzani (Lanciano) Regni Neapolitani a Julio Dott. Tommasini observata fuit.

Causae. Ex causis, quae hinc phlegmibus communes tribuuntur, talis fit distinctio.

I. Sunt enim in quas foetus materno adhuc in utero offendere potest a mala positione, a succussionibus sub immodica matris motibus, a partu laborioso vel artificiali. Ulterius, exercitiis gymnastica adolescentiae aetate, dum nimirum illa praecox est, nec est aptae corporis evolutionis adhuc confert; distensiones, sicuti A. Petit animadvertit, joco a quibusdam temere tentatae, quoniam scilicet, manibus maxillis appositis, positi vi extolluntur. Conatus insuper ad gravia hejulauda pondera, et capiti, dorso, humerisque committenda; lapsus ex altis super talos; nitens in rhedis non elasticis, et per aspera viarum; casus emargini, externae violentiae, vulnera, punctiones et

que meningum; dorsi verberatio; fracturae, denique, et luxationes vertebrae columnae.

II. Cause inflammationis propriae, ut incantata oppositis atmosphaeræ conditionibus expositio; insolatio; alimentorum calefactantium, liquorum spirituosorum, colutusque abusus; disturnior quædam corporis positio, cui, morbo præsertim chirurgico laborantes, vel artifices quidam, aut agricola, solis præsertim radiis ærentibus, demerantur.

III. Adnumerandæ demum sunt etiam nonnullæ phlogisticæ affectiones, quæ morbosæ radiatione sepe occurrunt ad medullam spinalem adire possunt, sicuti, exempli gratia, encephalitis et meningitis cerebri; peripneumonia juxta Frank; rheumatismus juxta Ribes; aneurysmata aortae, quæ, ut clarissimi scriptores opinati sunt, osium vertebrarum cariem sæpe meliorant. Habituum, denique, haemorrhagarum appetitiones, et subita erysipelatum, et exanthematum nonnullorum uteropulio, nec non malignæ uteri, genitalium, et partium medullæ spinali proximarum chronicæ passionēs.

Decursus, exitus, et Prognosis. — Rapidus non parum inflammationum rachiticarum est decursus; meningem illa, intra tertium, decimumque octavum diem agrum perimere potest; Ollivier ad trigessimum usque diem productam vidit. Decursus tamen chronicum inducere potest, uti

jam notabatur, sed huic, medullae potius illa inclinare videtur.

Hujus morbi exitus jam phlogosum communet sunt. Raro resolutio vias, rariusque vero gangraena, quam Harles nisi in ima medullae parte constitui censet, vix lumbi sic laxata, semperque superiori parca, ubi phlogosis, nec tam altior, necis causa fit.

Præterea observatae fuerant induratio, et emollitio, cui multae artuum inferiores paralytes, à Post, Sommering, Polletta etc. descriptae, tributae saepe. Inter varias meningitidis spinalis exitus notantur apoplexia myelica, et hydrocephalus seu spina-bifida.

In myelicide affectis dorsalis tabes, primo saltem gradu, veluti immodicae reactionis effectus medullae nervorumque ipsius, una cum gangliis ac vasis, ope sanguinis affluxu huc accessit e flagranti Venereis igne. Dein haec phlogosibus tribuantur apud dorsalia Worthington; tumores prima saltem ex origine aquosi à Raischio, Morgagni, aliisque nobis expositi; quaedam tandem, suppuratione inchoata, recurrent epilepsia.

Generatim asseri potest maximi hujusmodi affectiones periculi esse, et facillime, valida congrua, et sollicita medela deficiente, lethali ter evadere. Ita decima octava, vel trigesima sexta hora saepe in Neonata accidit. Chronice vero subdursu, decimo ad viginti usque annis, sa-

cultate matrici etiam omnino ablata, protrahi videbatur. Tum summum citamen discriminis adest, quum, parte, uti diximus, cervicalis afficiatur, cujus lacerationum vi, Legalleis, atque Fontani oes repente suo defungi officio animadvertere.

Cura. Quidquid auxilii methodus antiphlogistica offert, medullae inflammatio ardentius expulset, et generales ac topicae sanguinis missiones primum statuant subsidium. Attamen quoad illas, etsi minime negandum quod sanguis, e pulsum parvitate ac contractione, et e paralyti ipsa haud parcendum erit; nihilominus simul summo opere cavendum, quia, dum partis tam vitae necessariae phlogosis compensare optime hinc judicatur, illuc animadvertere necesse est quod ex medullae laceratione cordis vires facile languescunt, ac breviter dubium jam agi de transitu in ipsothemicum statum, locum habere posset. Hae igitur de causa illustris Raschetti suadet ut locales potius sanguinis depletiones summe instituas. Quoad intus pariter, Practici quamplurimum scarificationum usum cucurbitarum spinarum lateribus commendant, propter celerem harum ac latam actionem; nisi quod praefatus suctor hirudines potius praediligit, atque admoveere suadet, ut compressio quam peculorum oes in ramulos nervosos externos exercet, atque subaequa consensuali medullae irritatio effugiat, dum hirudines sanguinem expedite subtrahere possunt ex exter-

nis remia, qui in dorso ac lumbis intus ingre-
diantur, atque cum viscera propolis anastomi-
santur. — Præinde topice laudatur frigoris actio et
speciatim Schmuckeri balneum.

Interne autem acidi Borussici effectus, cas-
terorumque illud continentium præparatorum
laudibus quoque elati sunt. Hinc drastica eva-
cuantia, et diuretica, uti nîtrum, squilla, seleni
medii apta faciemus, nunquam tamen oblii ha-
rum de usu, quod ventriculus, aliæque abdomina-
lia viscera plus minusve nota phlogistica affi-
ciuntur.

Auctores quidam sacconi, Mercurii dulcis usum
tam interne, tam externe commendant. Clariss.
Breder prima periodo hirudinibus quamplurimis,
epithematibus, discutientibus, oleosis frictioni-
bus, balneis repetitis, altioribus nîtri dosibus, et
postremo arnica prospero successu usus est. Goelie
in pueris frigidas immersiones cepit, æquinoctia
iteratas specialiter memoravit.

Chronico sub statu embrogmata æque salitas,
fomenta aromatica, frictiones siccae, arnica, va-
leriana, cæteris, jam antiphlogisticis valido ten-
tatis, præsto utiliter erant.

In regimine diætetico ut vertebralis columnæ,
quod fieri potest, quies servetur, studiose com-
mouendum.



1

THESES DEFENDENDÆ

I.

Quotiescunque motus artuum musculares laeduntur, in spinali medulla morbi sedes inquirenda.

II.

Medullae spinalis actio eo magis efficax fit eoque minus ab encephalo pendet, quo magis ad animalis classis inferioris accedimus.

III.

Spinalis medulla rejunctim ab encephalo inflammari potest, et in pluribus distinctisque propriae extensionis punctis.

IV.

Sanguis factor, nervus tantum vitae moderator.

V.

In simplici febre gastrica phlebotomia semper nocet.

VI.

Interne sectione instituenda, simplici organici status, a verae plethorae statu distingui debet.

VII.

Robustiores homines illi recensendi, qui malo possent sanguine, non vero illi in quibus potius nervosum systema predominari observatur.

VIII.

Virile semen non ad generationis functionem tantum a natura donatum.

IX.

Tristes sequelae, quae onanismum plerumque sequuntur non tam ex nimis seminis jactura, quam ex irritatione et concussione nervi apparatus derivantur.

X.

Venus inmodica saepe sterilitatis causa.

XI.

Virtus salubris augmentum.

XII.

Medicina forensis portentum biceps, quippe quae individuum duplex merito agnoscit.

